

A heveny krízis elkerülése mellékvese elégtelenség miatt kezelt betegen

Betegájékoztató

Mellékvesekéreg elégtelenség okozta krízis alatt hirtelen kialakuló súlyos állapotot értünk, amire legtöbbször nagyfokú gyengeség, súlyos elesettség, hányinger, hányás, alacsony vérnyomás, olykor a vérkeringés összeomlása jellemző.

A heveny krízis legtöbbször az ismert mellékvesekéreg elégtelenségben (Addison-kór) szenvedő betegeken jelentkezik, kialakulhat azonban az agyalapi mirigy elégtelen működése következtében is. Agyalapi mirigy elégtelenséget okozhatnak a korábban szedett nagyadagú glükokortikoid tartalmú gyógyszerek is (Prednisolon, Metypred, Medrol, Dexamethason, stb.).

Stressz esetén (műtét, trauma, fertőzés, stb.) nagy adagú kortikosteroid injekciós adását igényelheti a krízis elkerülése céljából!

Enyhébb lázas betegség esetén dupla steroid adag átmeneti alkalmazására van szükség. Heveny mellékvese elégtelenség gyanúja esetén (hasi panaszok, elesettség, alacsony vérnyomás) gyakran sürgős kórházi elhelyezésre van szükség.

Ez a tájékoztató jellegénél fogva csak röviden tartalmazza az adott betegséggel kapcsolatos ismereteket. Részletesebb tájékoztatást az Ön vizsgálati eredményeit, esetleges egyéb betegségeit is ismerő kezelőorvosától kaphat.

A betegájékoztató a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság vezetősége jóváhagyásával készült. Összeállította:

Dr. Bajnok László
egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem,
I. sz. Belgyógyászati Klinika