

Pajzsmirigy betegség - gyermekek

Pajzsmirigy alulműködés (hypothyreosis) miatt tiroxint (L-thyroxin, Euthyrox, Letrox, Syntroxine) szedő gyermekek:

- A jól beállított pajzsmirigy alulműködés rendszeres gyógyszereszedés mellett nem jelent fokozott kockázatot a fertőzésekre vagy szövődményekre.
- Legyen otthon 2 havi gyógyszer tartalék, a gyógyszereszedés ne maradjon el!
- A kontrollvizsgálatot nyugodtan halaszthatjuk a járványügyi helyzet rendeződése utánra.

Pajzsmirigy túlműködés (Basedow kór, autonóm adenoma) miatt Metothyrint vagy Propycilt szedő gyermekek:

- Mind a Metothyrin, mind a Propycil el tudja rontani a vérképet, ezért láz esetén haladéktalanul (aznap!) történjen vérkép vizsgálat! Előfordulhat, hogy vénás antibiotikum kezelésre van szükség.
- A kezeletlen pajzsmirigy túlműködés fokozott kockázatot jelent mind a fertőzésekre, mind a szövődményekre, ezért nagyon fontos, hogy legyen elegendő gyógyszer, rendszeres legyen a gyógyszereszedés. Súlyos fertőzésben a pajzsmirigy túlműködés fellángolhat, ez nagyon megterheli a szervezetet.
- Metothyrin vagy Propycil szedése mellett viszonylag gyakori kontroll vérvételekre lehet szükség, ez alapján az endokrinológus a gyógyszeradag változtatását javasolhatja. Beszéljük meg a gondozó orvossal, melyik fázisban van a betegség, halasztható-e a kontroll vérvétel!

2020. március 22.

A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság betegtájékoztató csapata